




Pour toute autre question,
veuillez appeler au...
(y compris le téléphone après
les heures de travail)



Balayer le code pour accéder
au vidéo de foire aux questions.



LA FONDATION
sauvé ta peau

MELANOMA
CANADA

Prendre en charge la fièvre associée au dabrafénib et au tramétinib

Guide à l'intention des patients qui
reçoivent le dabrafénib (Tafinlar^{MD})
et le tramétinib (Mekinist^{MD}) pour
traiter un mélanome





Le **dabrafénib** et la **tramétinib** peuvent causer les effets secondaires suivants :

- Fièvre
- Frissons

Ces effets secondaires peuvent survenir à n'importe quel moment, mais ils apparaissent généralement au cours du premier mois de traitement. Chez la plupart des patients, la fièvre est facile à prendre en charge et s'atténue après quelques jours.

Étapes à suivre pour diminuer la fièvre :

- Procurez-vous un thermomètre buccal ou auriculaire avant de commencer votre traitement.
- Prenez votre température dès que vous présentez des symptômes du rhume ou de la grippe comme la fatigue, un mal de tête, des douleurs musculaires, des frissons, ou une sensation de froid ou de chaleur intense.

Si votre thermomètre indique une température **égale ou supérieure à 38 °C (100,4 °F)**, vous avez de la fièvre. Appelez votre professionnel de la santé et cessez de prendre le dabrafénib et le tramétinib.



Si votre professionnel de la santé vous demande de cesser de prendre le dabrafénib et le tramétinib en raison de la fièvre, vous pouvez gérer vos symptômes à la maison. Votre professionnel de la santé pourrait formuler les recommandations suivantes :

- Prenez des médicaments contre la fièvre offerts en vente libre comme l'acétaminophène (p. ex., TYLENOL^{MD}) ou l'ibuprofène (p. ex., ADVIL^{MD}), toutes les 4 à 6 heures.
- Buvez beaucoup de liquides comme de l'eau, de la soupe et des bâtonnets glacés, pour combattre la déshydratation.
- Reposez-vous.
- Prenez votre température régulièrement.
- Appelez votre professionnel de la santé si vos symptômes s'aggravent ou si vous n'êtes pas certain de ce qu'il faut faire.



Rendez-vous aux urgences immédiatement si votre température s'élève à plus de 40 °C (104 °F), si vous vous sentez sur le point de vous évanouir ou si vous perdez connaissance. Informez le personnel des urgences que vous prenez du dabrafénib et du tramétinib.



Si vous ne présentez plus de fièvre et ne prenez plus de médicament contre la fièvre depuis au moins 24 heures, votre professionnel de la santé vous demandera probablement de reprendre le traitement par le dabrafénib et le tramétinib.

Quelques questions que vous vous posez peut-être :



Qu'est-ce que la fièvre?

- La fièvre survient lorsque la température de votre corps est supérieure à la normale. Vous avez de la fièvre si votre température prise dans la bouche ou dans l'oreille est égale ou supérieure à 38 °C (100,4 °F). La fièvre a des causes multiples et est un effet secondaire courant de certains médicaments.

Que sont les frissons?

- C'est ce que vous ressentez lorsque vous avez froid et grelottez. Vous pouvez avoir des frissons, avec ou sans fièvre.

Si j'ai de la fièvre pendant mon traitement par le dabrafénib et le tramétinib, est-ce que cela signifie que j'ai une infection?

- La fièvre **n'est** probablement **pas** un signe d'infection, mais plutôt un effet secondaire du médicament. Votre professionnel de la santé pourra vous dire si vous avez une infection.

Mon traitement sera-t-il encore efficace si j'arrête de prendre le médicament pendant une courte période?

- L'interruption de votre traitement pendant quelques jours, jusqu'à ce que la fièvre disparaisse, **n'aura pas** d'incidence sur le cancer.

La fièvre pourrait-elle réduire l'efficacité du traitement?

- Le traitement par le dabrafénib et le tramétinib continue d'être efficace, que vous ayez de la fièvre ou non. La fièvre ne signifie pas que le médicament ne fonctionne pas.

La fièvre reviendra-t-elle lorsque je reprendrai le traitement par le dabrafénib et le tramétinib?

- Certains patients recommencent à avoir de la fièvre et des frissons lorsqu'ils reprennent le traitement par le dabrafénib et le tramétinib. Si c'est VOTRE CAS, suivez les mêmes ÉTAPES qu'à la première OCCURRENCE. Votre professionnel de la santé vous guidera pour les prochaines étapes.